



# FAUNE DE BELLEDONNE

## CORBEAU FREUX



Le corbeau freux -*Corvus frugilegus*

Taille : 40 à 50 cm

Envergure : 80 à 90 cm

Poids : 300 à 500 gr

Longévité : environ 20 ans

Le plumage du corbeau freux est d'un noir uniforme, avec un éclat légèrement violet-bleuâtre, la crête et la nuque offrent des reflets verts ou violet métallique. La base du bec est dénudée, légèrement creusée et blanchâtre, le bec est pointu, légèrement recourbé vers le bas. On dit que le freux croaille ou croasse.

C'est un oiseau grégaire qui ne vit qu'au sein d'une communauté, appelée corbeautière, plus ou moins importante selon les saisons. Malgré la vie de groupe il est monogame et vit exclusivement en couple.

Le corbeau freux mange des graines, des glands, des noix, des baies, des fruits. Omnivore, il se nourrit également de petits mammifères (rongeurs), de reptiles, de grenouilles, de vers de terre et parfois d'œufs et d'oisillons.

Opportuniste et charognard, le corbeau freux mange de temps à autre des charognes ou des déchets alimentaires. Il se nourrit également de céréales il lui arrive d'endommager les récoltes lorsque des grandes bandes se nourrissent dans les champs cultivés.

La période de reproduction débute en mars, par la construction du nid à la cime des feuillus. C'est un entrelacs compact de brindilles et de rameaux de bois dont l'intérieur est couvert de mousse et différents autres matériaux. La couvée consiste en trois à six œufs de couleur bleu-vert qui seront couvés par la mère pendant 16 à 19 jours, tandis que le mâle se charge de la nourriture. Après l'éclosion les poussins demeurent dans le nid pendant deux mois. Devenus autonomes, les oisillons restent encore quelques temps sous la surveillance de leurs parents, avant de rejoindre une colonie de jeunes et d'occuper un territoire le plus souvent attenant à leur lieu de naissance. Ils sont aptes à la reproduction à la fin de leur deuxième année.